

ANAPEN[®]

ADRENALIN – AUTOINJEKTOR

Effektiv.
Einfach.
Günstig.

Zur Notfallbehandlung
von akuten
allergischen Reaktionen
(Anaphylaxie)



Anapen[®] 500 µg
PZN 15896166
AVP 76,68 €

Anapen[®] 300 µg
PZN 15211429
AVP 76,68 €

Anapen[®] Junior 150 µg
PZN 15405010
AVP 76,68 €

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Bioprojet Deutschland GmbH


☎ 030/346 554 60 - 0

📄 030/346 554 60 - 9

✉ anapen@bioprojet.de

🌐 www.anapen2.de

Spezifikation:

Anapen® 500 µg	Haltbarkeit*	Nadellänge ¹	Körpergewicht ¹	Preis pro Pen ²
	24 Monate	10 mm ± 1.5 mm	> 60 kg	76,68 €
Anapen® 300 µg	Haltbarkeit*	Nadellänge ¹	Körpergewicht ¹	Preis pro Pen ²
	24 Monate	10 mm ± 1.5 mm	> 30 kg	76,68 €
Anapen® 150 µg	Haltbarkeit*	Nadellänge ¹	Körpergewicht ¹	Preis pro Pen ²
	21 Monate	10 mm ± 1.5 mm	15** – 30 kg	76,68 €

¹ Fachinformation Anapen® Junior 150 µg Injektionslösung / Anapen® 300 µg Injektionslösung, Stand: Januar 2019; Fachinformation Anapen® 500µg Injektionslösung, Stand: November 2020, * ab Herstellungsdatum, ** bei lebensbedrohlicher Situation und unter medizinischer Aufsicht, Anwendung auch bei geringerem Gewicht, ² LL. Lauertaxe, Stand: 01.03.2022

Bestellbar über den Pharmazeutischen Großhandel oder Movianto Deutschland:

☎ 06821 / 50 16 150

✉ 06821 / 50 16 521

✉ auftragsannahme.neunkirchen@movianto.com

Anapen® Junior 150 Mikrogramm Injektionslösung / Anapen® 300 Mikrogramm Injektionslösung / Anapen® 500 Mikrogramm Injektionslösung. Wirkstoff: Adrenalin (Epinephrin). **Zus.:** Anapen® Junior: Ein Milliliter enthält 0,5 mg Adrenalin (Epinephrin). Eine Dosis von 0,3 ml enthält 150 Mikrogramm Adrenalin (Epinephrin). Anapen® 300: Ein Milliliter enthält 1 mg Adrenalin (Epinephrin). Eine Dosis von 0,3 ml enthält 300 Mikrogramm Adrenalin (Epinephrin). Anapen® 500: Ein Milliliter enthält 1,7 mg Epinephrin (Adrenalin). Eine Dosis von 0,3 ml enthält 500 Mikrogramm Epinephrin (Adrenalin). Sonstige Bestandt.: Natriumchlorid, Natriummetabisulfit (E 223), Salzsäure, Wasser für Injektionszwecke. **Anw.:** Notfallbehandlung von akuten allergischen Reaktionen (Anaphylaxie), verursacht durch Erdnüsse und andere Nahrungsmittel, Arzneimittel, Insektenbisse oder -stiche und andere

Allergene sowie belastungsinduzierte oder idiopathische Anaphylaxie. **Gegenanz:** Überempfindlichkeit gegen Adrenalin (Epinephrin) oder einen der sonstigen Bestandteile. Für die Verwendung von Anapen® / Anapen® Junior während eines allergischen Notfalls gibt es jedoch keine absoluten Kontraindikationen. **Nebenw.:** Hypertykämie, Hypokaliämie, metabolische Azidose, Angstgefühle, Halluzinationen, Kopfschmerzen, Schwindel, Tremor, Synkopen, Mydriasis, Tachykardie, Herzrhythmusstörungen (Kammerflimmern/Herzstillstand), Palpitationen, plötzlicher Blutdruckanstieg (bis hin zur Hirnblutung), Vasokonstriktion (z. B. in der Haut, den Schleimhäuten und Nieren), Kältegefühl an den Extremitäten, Atembeschwerden, Übelkeit, Erbrechen, Miktionsstörungen mit Harnverhalt, Schwitzen, Hautblässe, Schwäche, Beklommenheit, Nervosität, Muskelzittern. Aufgrund des Gehaltes an Natriummetabisulfit bei anfälligen

Patienten: allergieähnliche Reaktionen, u.a. anaphylaktische Reaktionen, Asthmaanfälle. **Warnhinw.:** Sofort nach der Anwendung von Anapen® / Anapen® Junior einen Rettungswagen rufen und als Grund „Anaphylaxie“ angeben. Bitte die beigefügte Gebrauchsinformation lesen, bevor ein Notfall eintritt. Nur gemäß Anweisung Ihres Arztes anwenden. Zur einmaligen Anwendung. Enthält Natrium und Natriummetabisulfit (E 223). Packungsbeilage beachten. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. **Verkaufsabgrenzung:** Verschreibungspflichtig. **Zulassungsinhaber:** Bioprojet Pharma, 9 rue Rameau, 75002 Paris, Frankreich. **Stand der Information:** 01/2021.

